



Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) Codice fiscale 93423450720

Email: [baic824008@istruzione.it](mailto:baic824008@istruzione.it) – tel./fax. 0804552013 – PEC: [baic824008@pec.istruzione.it](mailto:baic824008@pec.istruzione.it)

**SITO WEB: ICSAVIOMONTALCINI.EDU.IT**

**Cir. Int. n. 76**

**Capurso, 05/12/2022**

**Alla Comunità Scolastica**

**- S E D E -**

**Oggetto: Segnalazione casi di scarlattina nella Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta”**

Si comunica che tra gli alunni della Scuola “Madre Teresa di Calcutta” è stato accertato un caso di scarlattina.

Si consiglia pertanto alle famiglie di sottoporre i propri figli a sorveglianza sanitaria, al fine di rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre. Solo in caso di insorgenza di sintomi, essendo una malattia contagiosa, è bene consultare il medico.

I collaboratori scolastici avranno cura di areare il più possibile i locali e disinfettare pavimenti delle aule, banchi e sedie, giocattoli e sussidi didattici.

Si fornisce, inoltre, nell’ambito di un’azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un’informativa sulla scarlattina.

**DEFINIZIONE**

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A.

**DESCRIZIONE**

Come ci si contagia. Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando. Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall’inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione. In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

Contagiosità. In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell’inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un’adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

La prevenzione. L’unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Francesca De Ruggieri